


## Gérer l'épisode suicidaire – Plan Prévention Suicide - Suivi (PPS-S)

**Quand?** Dans les heures ou les jours suivant l'épisode suicidaire initial, selon le niveau de danger et les besoins de la personne



Nom, Prénom :	Date du suivi:
Nom de la personne faisant le suivi :	Lien avec l'utilisateur :

<p><b>Information à recueillir :</b> Indicateurs sur lesquels appuyer votre <b>jugement clinique</b> quant à l'évolution du danger suicidaire et de l'épisode.</p> <p><b>Changement dans les MAAS</b> Types de MAAS présents lors du suivi : Communications verbales/non-verbales, Comportements, Pensées Éléments de planification suicidaire présents lors du suivi : Moyen, moment, lieu, préparatifs de départ, Danger lors du suivi, Accès au moyen, létalité du moyen (réelle et perçue par la personne), capacité de planification</p> <p><b>Changements dans les déclencheurs</b></p> <p><b>Moments critiques identifiés lors du suivi</b> En cours ou anticipés, Bons moments et moments plus difficiles ces derniers jours, depuis l'épisode suicidaire initial.</p> <p><b>Changement dans les facteurs de risque et de protection actuels</b> Facteurs de risques proximaux pouvant augmenter le danger lors du suivi.</p> <p><b>Facteurs de protection présents lors du suivi</b></p>	Observer	<p><b>Observer :</b> Information recueillie Sources : Questions à l'utilisateur, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l'utilisateur</p>
	Décider	<p><b>Décider :</b> Décision quant aux changements dans l'épisode et le danger suicidaire</p> <p>Changement dans le danger à court terme pour la personne :</p>
	Agir	<p><b>Agir :</b> Intervenir pour ajuster le plan d'action en fonction de l'évolution des besoins de la personne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmenter ou réduire les mesures de sécurité mises en place</li> <li>- Ajuster le plan d'action</li> <li>- Planifier le prochain suivi</li> </ul>