

## Plan prévention suicide (PPS) – Suivi post épisode suicidaire

Quand? Dans les heures ou les jours suivant l'épisode suicidaire initial, selon le niveau de danger et les besoins de la personne.

Nom, Prénom :		Date du suivi :	
Nom de la personne faisant le suivi :		Lien avec l'utilisateur :	
<p><b>Information à recueillir</b> : Indicateurs sur lesquels appuyer votre <b>jugement clinique</b> quant à l'évolution du danger suicidaire et de l'épisode.</p> <p><b>Changement dans les MAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Types de MAAS présents lors du suivi : communications verbales/non-verbales, comportements, pensées</li> <li>- Éléments de planification suicidaire présents lors du suivi : moyen, moment, lieu, préparatifs de départ, danger lors du suivi, accès au moyen, létalité du moyen (réelle et perçue par la personne), capacité de planification</li> </ul> <p><b>Changements dans les déclencheurs</b></p> <p><b>Moments critiques identifiés lors du suivi</b> En cours ou anticipés, bons moments et moments plus difficiles (ces derniers jours et depuis l'épisode suicidaire initial).</p> <p><b>Changement dans les facteurs de risque et de protection actuels</b> Facteurs de risques proximaux pouvant augmenter le danger lors du suivi.</p> <p><b>Facteurs de protection présents lors du suivi</b></p>	Observer	<p><b>Observer</b> : Information recueillie Sources : Questions à l'utilisateur, observations, questions à des intervenants ou des proches, dossier de l'utilisateur</p>	
	Décider	<p><b>Décider</b> : Décision quant aux changements dans l'épisode et le danger suicidaire</p> <p>Changement dans le danger à court terme pour la personne</p>	
	Agir	<p><b>Agir</b> : Intervenir pour ajuster le plan d'action en fonction de l'évolution des besoins de la personne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmenter ou réduire les mesures de sécurité mises en place</li> <li>- Ajuster le plan d'action</li> <li>- Planifier le prochain suivi</li> </ul>	